



Dès 6 mois

## Entre l'allaitement au sein et Relia 2...

### ... IL N'Y A QU'UNE (GOU)GOUTTE

On est tou.te.s d'accord : le lait maternel est l'aliment idéal pour les nourrissons. Et si l'on préfère en général retarder le plus tard possible le passage au biberon, la vie et ses contraintes se chargent très vite de nous rappeler que ce n'est pas toujours facile. Pour autant, aucune raison de culpabiliser !

Pour passer le relais en douceur du sein au biberon, Les Laboratoires Novalac proposent Novalac Relia 2, un lait infantile conçu pour répondre aux besoins nutritionnels de bébé dès 6 mois, au sein d'une alimentation diversifiée.

Sa formule associe :

- de la vitamine D\* qui participe au fonctionnement normal du système immunitaire
  - des fibres de type galacto-oligosaccharides (GOS)\*
  - du DHA\*\* : la consommation d'acide docosahexaénoïque (DHA) contribue au développement normal de la vue des nourrissons jusqu'à 12 mois
- Novalac Relia 2 s'utilise en allaitement mixte ou lors du sevrage jusqu'à 1 an.



**NOVALAC RELIA 2**

Boîte recyclable de 800 g, PVC : **21,82 €**

Code ACL : 3 518 073 423 017

**Exclusivement en pharmacie**

— [laboratoires-novalac.fr](http://laboratoires-novalac.fr) —

Laboratoires  
**Novalac**  
LES DOUTES DES PARENTS  
MÉRITENT DES RÉPONSES D'EXPERTS

### LA RÉPONSE DE L'EXPERT

“ Je dois prévoir  
combien de temps  
pour sevrer mon bébé ? ”

« Dans l'idéal, il faut prendre son temps, c'est-à-dire remplacer une tétée toutes les semaines par un biberon. Par exemple, si votre petit bout tête 4 ou 5 fois par jour, prévoyez alors 4 à 5 semaines. Ça vous semble trop long ? Ou compliqué à mettre en œuvre ? Pas de problème ! Il est tout à fait possible de remplacer une tétée tous les 3-4 jours. Vous serez ainsi sur une durée de sevrage de 2 semaines. On sait que vous ferez au mieux ! »

**Dr Camille Jung, Gastro-pédiatre**  
Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil



\*Conformément à la réglementation en vigueur

\*\*Comme l'exige la réglementation pour tous les laits de suite : l'effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 100 mg de DHA.

Avis important : le lait maternel est l'aliment idéal pour chaque nourrisson. Une bonne nutrition maternelle est essentielle pour préparer et maintenir l'allaitement. Les laits infantiles sont destinés à remplacer l'allaitement maternel si celui-ci n'est pas choisi, n'est pas adapté, est arrêté prématurément ou doit être complété. L'allaitement mixte peut gêner l'allaitement maternel et il est difficile de revenir sur le choix de ne pas allaiter. La mauvaise préparation d'un lait infantile peut entraîner des risques pour la santé des nourrissons et il est important de suivre les conseils pour une bonne reconstitution des laits infantiles. Les implications socio-économiques doivent être prises en compte dans le choix de la méthode d'allaitement. Ce document doit être utilisé dans le respect de la réglementation en vigueur sur les laits infantiles.



**CONTACT PRESSE Hélène** Tél. : 01 44 54 54 07 / 06 21 37 66 94 / [enfant@franckdrapeau.com](mailto:enfant@franckdrapeau.com)  
Visuels sur demande ou téléchargeables sur [www.franckdrapeau.com](http://www.franckdrapeau.com), Espace Journalistes